

Tarjeta de información para el paciente

Rivaroxabán comprimidos/cápsulas/granulado para suspensión oral

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2024

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

Información para cuidadores/pacientes:

- ♦ Lleve siempre consigo esta tarjeta
- ♦ Muestre esta tarjeta a todos los médicos o dentistas antes de recibir otro tratamiento

Rivaroxabán 2,5 mg comprimidos/cápsulas ☐

Rivaroxabán 10 mg comprimidos/cápsulas ☐

Rivaroxabán 15 mg comprimidos/cápsulas ☐

Rivaroxabán 20 mg comprimidos/cápsulas ☐

Rivaroxabán 1 mg/ml granulado para suspensión oral ☐

Mire el video educativo que muestra cómo preparar y administrar la suspensión oral.

go.bayer.com/junior



El paciente que está recibiendo tratamiento anticoagulante con rivaroxabán

Nombre:.....

Dirección:.....

Fecha de nacimiento:.....

Peso:.....

Otros medicamentos / afecciones:.....

En caso de urgencia, por favor, avisen a:

Nombre del médico:.....

Número de teléfono del médico:.....

Sello del médico:

Por favor, notifiquen también a:

Nombre:.....

Teléfono:.....

Parentesco:.....

Información para el profesional sanitario:

- ♦ No deben utilizarse los valores de INR ya que no son una medida válida de la actividad anticoagulante de rivaroxabán.

¿Qué tengo que saber acerca de rivaroxabán?

- ♦ Rivaroxabán hace la sangre más fluida, lo que previene la formación de coágulos de sangre.
- ♦ Debe tomarse rivaroxabán exactamente como el médico haya indicado. Para asegurar una protección óptima frente a la formación de coágulos sanguíneos, **no se debe dejar de tomar nunca una dosis.**

- ◆ No deje de administrar/tomar rivaroxabán sin consultar antes con el médico ya que esto aumentaría el riesgo de que se formen coágulos de sangre.
- ◆ Informe al médico de cualquier otro medicamento que el niño/usted esté tomando, ha tomado recientemente o vaya a empezar a tomar, antes de tomar rivaroxabán.
- ◆ Diga al médico que el niño/usted está tomando rivaroxabán antes de una intervención quirúrgica o de un procedimiento invasivo.

¿Cuándo debo pedir consejo al médico?

Si administra/toma un anticoagulante como rivaroxabán es importante que conozca sus posibles efectos adversos. El efecto adverso más frecuente es el sangrado. No empiece a administrar/tomar rivaroxabán si sabe que el niño/usted tiene riesgo de presentar un sangrado sin hablarlo antes con el médico.

Dígale inmediatamente al médico si el niño/usted tiene algún signo o síntoma de sangrado, como por ejemplo:

- ◆ Dolor
- ◆ Hinchazón o molestias
- ◆ Dolor de cabeza, mareos o debilidad
- ◆ Moratones anormales, sangrado por la nariz, las encías o cortes que tardan mucho en dejar de sangrar
- ◆ Flujo menstrual o sangrado vaginal más abundante de lo normal
- ◆ Sangre en orina, que puede ser de color rosado o marrón, deposiciones de color rojo o negro
- ◆ Tos con sangre o vómitos de sangre o de un material que tiene aspecto de grumos de café

¿Cómo debo tomar rivaroxabán? / ¿Cómo debo administrar rivaroxabán al niño?

- ◆ Para garantizar una protección óptima, rivaroxabán
 - 2,5 mg puede tomarse con o sin alimentos.
 - 10 mg puede tomarse con o sin alimentos.
 - 15 mg debe tomarse con alimentos.
 - 20 mg debe tomarse con alimentos.
 - 1 mg/ml debe administrarse/tomarse con alimentos (leche materna o de fórmula) o con las comidas.
- Se puede administrar a través de una sonda nasogástrica o gástrica.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.