This Panel must appear as the front panel once wrapping is done along with the PIL

Front

PATIENTENKARTE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

Apixaban

Sie/das Kind/die Betreuungsperson sollte(n) diese Karte ständig bei sich tragen.

Zeigen Sie diese Karte dem Apotheker, dem Zahnarzt und allen Ärzten, bevor eine Behandlung erfolgt.

Information für Patienten/Betreuungspersonen

- Nehmen/Verabreichen Sie Apixaban regelmäßig nach den Anweisungen Ihres Arztes (ein). Wenn Sie eine morgendliche Einnahme vergessen haben, nehmen Sie/verabreichen Sie die Tablette, sobald Sie es bemerkten; die Einnahme/Verabreichung kann zusammen mit der Abenddosis erfolgen. Eine vergessene Abenddosis darf nur am selben Abend eingenommen/verabreicht werden. Nehmen/Verabreichen Sie am nächsten Morgen nicht zwei Dosen (ein); setzen Sie

stattdessen die Einnahme/Verabreichung wie gewohnt zweimal täglich wie empfohlen am nächsten Tag fort.

- Brechen Sie die Behandlung mit Apixaban nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt ab, da bei Ihnen/dem Patienten das Risiko eines Schlaganfalls/Blutgerinnsels oder anderer Komplikationen besteht.
- Apixaban hilft, das Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.
- Anzeichen und Symptome von Blutungen können Blutergüsse oder Einblutungen unter der

Haut, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, Schwäche, plötzliche starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.

- **Suchen Sie umgehend einen Arzt auf**, falls bei Ihnen eine Blutung nicht selbständig aufhört.
- Falls bei Ihnen/dem Patienten eine Operation oder ein invasiver Eingriff notwendig sein sollte, informieren Sie vor der Operation den behandelnden Arzt, dass Sie/der Patient Apixaban einnehmen/einnimmt.

Back

Ich werde mit dem Antikoagulans Apixaban behandelt, um der Entstehung von Blutgerinnseln vorzubeugen.

Information für Arzt und Apotheker

- Apixaban ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.
- Apixaban kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Apixaban unverzüglich abzubrechen.
- Die Behandlung mit Apixaban erfordert keine

Routineüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer anti-Faktor Xa Test kann in Ausnahmesituationen, z. B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein (Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) Gerinnungstests sind nicht empfohlen) - siehe Fachinformation.

- Ein Arzneimittel zur Aufhebung der Anti-FXa-Aktivität von Apixaban steht zur Verfügung; seine Sicherheit und Wirksamkeit wurde jedoch bei

pädiatrischen Patienten nicht erwiesen (siehe Fachinformation zu Andexanet alfa).

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie den Arzt darum

Name:

Geburtsdatum:

Indikation:

Gewicht:

Dosierung: ..... mg 2 x täglich

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

Version 2.0 - Stand: 03/2025