

Front

Patientenkarte zur sicheren Anwendung Wichtige Warnhinweise zur Anwendungssicherheit für Patienten, die Bosentan Cipla (Bosentan) einnehmen Diese Karte enthält wichtige Information zu Bosentan Cipla. Bitte lesen Sie diese Karte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Bosentan Cipla beginnen.		Ihr Name: _____ Behandelnder Arzt: _____ Wenn Sie Fragen zu Bosentan Cipla haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt. Empfängnisverhütung Wenden Sie zur Zeit Verhütungsmittel an? ☐ ja ☐ nein	Falls JA, notieren Sie bitte hier die Bezeichnungen: _____ _____ Nehmen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit, sie/er wird Sie informieren, ob Sie zusätzliche oder andere Verhütungsmethoden benötigen. Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, lesen Sie diese Karte bitte sehr sorgfältig 21113615	Schwangerschaft Bosentan Cipla kann schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Fötus haben. Daher dürfen Sie Bosentan Cipla nicht einnehmen, wenn sie schwanger sind. Sie dürfen während der Behandlung mit Bosentan Cipla auch nicht schwanger werden. Darüber hinaus kann es, wenn Sie an pulmonaler Hypertonie leiden, bei einer Schwangerschaft zu einer schwerwiegenden Verschlechterung Ihrer Krankheitssymptome kommen. Falls Sie vermuten, dass Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt oder Gynäkologen.
---	---	---	---	--

Back

Empfängnisverhütung Eine Verhütung basierend auf Hormonen – wie orale Verhütungsmittel und Antibabypillen, Hormonspritzen, Implantate oder Verhütungspflaster, ist keine zuverlässige Methode, um eine Schwangerschaft bei mit Bosentan Cipla behandelten Frauen zu verhindern. Sie müssen Barriere-Methoden – wie ein Kondom für die Frau, Diaphragma oder einen Verhütungs-Schwamm – zusätzlich zu irgendeinem dieser hormonalen Verhütungsmittel anwenden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Ihre Fragen mit Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen besprechen	– füllen Sie bitte die Rückseite dieser Karte aus und bringen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit. Bei Ihnen sollte ein Schwangerschaftstest vor Beginn der Bosentan Cipla-Therapie und monatlich während der Behandlung durchgeführt werden, auch wenn Sie glauben, dass Sie nicht schwanger sind. Datum des ersten monatlichen Schwangerschaftstests: _____	Blutuntersuchung zur Leberfunktion Bei einigen Patienten, die Bosentan Cipla eingenommen haben, wurden veränderte Leberfunktionswerte festgestellt. Während der Behandlung mit Bosentan Cipla wird Ihr Arzt Termine für regelmäßige Blutuntersuchungen ansetzen. Dabei wird überprüft, ob Veränderungen Ihrer Leberfunktion aufgetreten sind. Denken Sie an die monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion. Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt. 21113615	Datum des ersten monatlichen Tests: _____ Termine für Ihre monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion: Jan _____ Mai _____ Sep _____ Feb _____ Juni _____ Okt _____ März _____ Juli _____ Nov _____ Apr _____ Aug _____ Dez _____ Version 02/BOS/001/09.2026 (DE) Cipla
--	--	---	---